

TOMOSCINTIGRAFIA MIOCARDICA (SPET) DI PERFUSIONE A RIPOSO E DOPO STIMOLO

Informazioni per il paziente

- Presentarsi in ospedale per l'accettazione un'ora prima dell'esame.
- L'esecuzione dell'esame prevede una permanenza in reparto di circa **sette ore**.
- E' necessario portare **tutta la documentazione cardiologica precedente**.
- **Terapia medica:**
 - E' possibile assumere la terapia della mattina con un po' di acqua.
 - Devono essere sospesi **solo i farmaci indicati dal Medico Curante o dal Cardiologo**.
 - Portare i farmaci necessari per la giornata.
- E' necessario stare a **digiuno** da mezzanotte precedente l'esame (si può bere l'acqua).
- Evitare caffè e/o tè nelle 24-36 ore precedenti l'esame.
- Portare con se due pasti:
 - 2 brioches o 2 panini (prosciutto e formaggio)
 - da bere: ½ litro di latte o 2 succhi di frutta
 - I pazienti **diabetici** devono portare panini e succhi non contenenti zucchero.
- I due pasti verranno assunti:
 - il primo in seguito all'esame sotto sforzo,
 - il secondo subito dopo la parte a riposo.
- Tra la parte dell'esame sotto sforzo e la parte a riposo ci sarà un periodo di attesa durante il quale è necessario stare nelle apposite sale all'interno del reparto.
- Al termine dell'esame non sostare all'interno dell'Istituto (bar), ma uscire dall'ospedale senza soffermarsi in luoghi pubblici (supermarket, ristoranti). Evitare fino al giorno successivo vicinanza con donne gravide e bambini sotto i 12 anni.

Informazioni per il medico di base

Egregio Collega,

desidero informarti sulle modalità di prescrizione con il Servizio Sanitario Nazionale dell'esame

Tomoscintigrafia miocardica perfusionale

L'esame prevede l'esecuzione dell'elettrocardiogramma sotto sforzo cui segue, dopo circa un'ora, l'acquisizione delle immagini. Dopo circa tre ore dal primo esame sono acquisite le immagini a riposo.

Qualora sia necessario un test farmacologico, questo è sostituito al test ergometrico.

L'impegnativa necessaria (ricetta unica) deve riportare la seguente dicitura:

tomoscintigrafia miocardica di perfusione a riposo o dopo stimolo - cod. 92092
per l'esecuzione dell'esame sotto sforzo

+

tomoscintigrafia miocardica di perfusione a riposo o dopo stimolo - cod. 92092
per l'esecuzione dell'esame a riposo

A seconda delle finalità dell'esame, potrà essere necessario effettuare un'adeguata sospensione dei farmaci coronaroattivi.

Restando a disposizione per eventuali ulteriori informazioni, porgo distinti saluti.

Dott. Arturo Chiti